



Neocate
infant



Neocate Infant con DHA y ARA
Fórmula infantil hypoalergénico y nutritivamente completo
basada en aminoácidos con DHA y ARA

Características

- Hipoalergénico
- Incluye DHA y ARA
- Aminoácidos 100% libres
- Nutritivamente completo
- Incluye nutrientes importante presentes en leche materna
- Perfil de amino ácidos similar alde la leche materna

Indicaciones

- Alergias a la leche de vaca y soya
- Intolerancia a múltiples proteínas alimentarias
- Síndrome de intestino corto
- Esofaguitis eosinofílica
- Enfermedad de reflujo gastroesofágico
- Transición de nutrición parenteral a nutrición entérica
- Otras enfermedades médicas que requieran de dieta basada en aminoácidos

Neocate Infant con DHA y ARA

Nutrientes

	Por 100 g	Por 100 kcal
Calorías	421	100
Equivalente proteínico, g	13	3.1
Grasa, g	19.1	4.5
Carbohidratos, g	49.3	11.7
Ácido linoléico, mg	2850	677
Vitaminas		
Vitamina A, IU (mcg RE)	1721 (517)	409 (123)
Vitamina D ₃ , IU (mcg)	252 (6.3)	59.9 (1.5)
Vitamina E, IU (mg α TE)	4.8 (3.2)	1.14 (0.76)
Vitamina K, mcg	37	8.79
Tiamina, mcg	390	92.6
Riboflavina, mcg	580	137.8
Vitamina B ₆ , mcg	520	123.5
Vitamina B ₁₂ , mcg	1.1	0.26
Niacina, mcg	6500	1544
Ácido fólico, mcg	43	10.2
Ácido pantoténico, mcg	2610	620
Biotina, mcg	13	3.1
Vitamina C, mg	39	9.26
Colina, mg	55	13.1
Inositol, mg	98	23.3

	Por 100 g	Por 100 kcal
Minerales		
Calcio, mg	522	124
Fósforo, mg	392	93.1
Magnesio, mg	52	12.4
Hierro, mg	7.8	1.85
Zinc, mg	7	1.66
Manganeso, mcg	380	90
Cobre, mcg	520	124
Yodo, mcg	65	15.4
Molibdeno, mcg	20	4.75
Cromo, mcg	15	3.56
Selenio, mcg	15.7	3.73
Sodio, mg	157	37.3
Potasio, mg	653	155.1
Cloruro, mg	325	77.2
Distribución energética		
Grasa (MCT 5% LCT 95%)		41%
Carbohidratos		47%
Proteína		12%
Osmolalidad, mOsm/kg		375
Dilución estándar = 0.67 kcal/ml		

Ingredientes

Sólidos de miel de maíz, aceite vegetal refinado (coco, soya), aceite de cártamo altamente oleico, fosfato de calcio dibásico, L-arginina, aspartato, tripotasio citrato, L-leucina, acetato de L-lisina, L-glutamina, L-prolina, L-valina, glicina, L-isoleucina, CAEM (como emulsificador), L-treonina, L-fenilalanina, L-tirosina, L-serina, L-histidina, L-alanina, cloruro de sodio, L-cistina, L-triptofan, L-metionina, acetato de magnesio, aspartato de magnesio, cloruro de potasio, aceite alpina M.*, colina de bitartrato, M-inositol, aceite Cohnii C.**, ácido ascórbico, sulfato ferroso, sulfato de zinc, taurina, L-carnitina, niacinamida, aceite de girasol, DL-alfa-tocoferol acetato, pantotenato de calcio D, sulfato cúprico, sulfato manganoso, hidrocloreto de piridoxina, riboflavina, acetato de vitamina A, hidrocloreto de tiamina, palmitato ascorbilo, yoduro de potasio, sulfato de cromo, DL-alfa-tocoferol, filoquinona, molibdato de sodio, ácido fólico, selenita de hidrógeno y de sodio, D-biotina, vitamina D₃, cianocobalamina.

* Una fuente de ácido araquidónico (ARA)

** Una fuente de ácido docosahexaenóico (DHA)

Instrucciones de preparación y uso

Neocate Infant puede mezclarse con agua* estéril tibia o fresca. No hierva la fórmula, ni use un horno microondas para prepararla o calentarla. Para diluirla normalmente, utilice el cucharón suministrado (4.75 g) y mezcle el contenido de un cucharón lleno por cada onza líquida (29.5 cc) de fórmula preparada.

Para alimento oral o por sonda alimentaria:

1. Coloque el contenido de 5 cucharones de Neocate Infant en un recipiente limpio y estéril.
2. Llénelo con agua estéril tibia o fresca hasta la línea que indica 5 onzas líquidas.
3. Agite entre 15 y 20 segundos o hasta que se disuelva el polvo.

*El método más apropiado para esterilizar agua, botellas, tetinas y utensilios de mezclado es hervirlos.

Lo óptimo es la fórmula recién preparada. Lleve la fórmula premezclada al refrigerador y utilícela dentro de las 24 horas de haberla preparado. Agítela antes de utilizarla. Deseche del biberón la fórmula que sobra una vez que haya transcurrido

una hora del momento de la alimentación. En el caso de la alimentación por sonda, el tiempo de permanencia fuera del refrigerador no debe exceder las 4 horas.

Volumen deseado	Cantidad de Neocate en polvo	Agua para agregar
8 oz líq. (236.5 cc)	8 cucharones o 38 g	7 oz líq. (207 cc)
12 oz líq. (355 cc)	12 cucharones o 1/2 taza o 57 g	11 oz líq. (325 cc)
24 oz líq. (709 cc)	24 cucharones o 1 taza o 114 g	21 oz líq. (621 cc)
48 oz líq. (1419 cc)	48 cucharones o 2 tazas o 228 g	42 oz líq. (1242 cc)

Medidas caseras

1 taza	1/2 taza	1/3 taza	1/4 taza	1 cucharada sopera	2 cucharadas cucharada	1/2 cafetera
114 g	57 g	35 g	30 g	7 g	2 g	1 g

Las medidas en casa son solamente aproximaciones. Para que sean exactas utilice una báscula de gramos.

Almacenamiento:

Cubrir y almacenar lata abierta en lugar seco y fresco. Use en el plazo de un mes. Almacene las latas no abiertas en temperatura ambiental. Evite las temperaturas extremas.

Datos de pedido de Neocate Infant

Código de producto	Código de reembolso	Código de HCPCS	Embalaje
12595	49735-0125-95	B4161	4 x 400 g

Para obtener precios bajos, información sobre el producto y para informarse sobre las alergias a la leche y otras enfermedades relacionadas, comuníquese:

1-800-Neocate o www.Neocate.com




Neocate[®]
www.Neocate.com

NUTRICIA
North America